



Référence : PRA PR IN 002	Version : 1.0	
Rédacteur :	Habiba MOUSSA	
Validation :	Sami DHAOUADI	Date : 11/10/2012
Approbateur :	Dr Hamdi DHAOUADI	Date : 11/10/2012

Principales indications

Le but de cet examen est la recherche d'une éjaculation rétrograde

Préconisations de prélèvement :

Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de 3 à 4 jours.

- La veille au soir, prendre une cuillère à café de bicarbonate de soude.
- Le matin du recueil, boire un litre d'eau et prendre une cuillère à café de bicarbonate de soude (environ deux heures avant le recueil).
- Lavage soigneux des mains au savon.
- Lavage du gland avec la lingette désinfectante remise par le laboratoire.
- Après masturbation, recueil d'éjaculat pur isolé dans le flacon stérile mis à disposition par le laboratoire (Ne rien perdre du prélèvement ou le mentionner lors de l'enregistrement du dossier).
- Attendre 5 à 10 minutes.
- Recueil des premiers jets d'urines dans le 2^{ème} flacon.
- Identifier les flacons avec votre nom, prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.

Transport au laboratoire

Si les flacons doivent être acheminés au laboratoire, ils doivent être maintenus à **37°C** pendant le trajet et apportés dans un délai **inférieur à 30 minutes**