



Référence : PRA PR IN 002		Version : 1.0
Rédacteur :	Habiba MOUSSA	
Validation :	Sami DHAOUADI	Date : 11/10/2012
Approbateur :	Dr Hamdi DHAOUADI	Date : 11/10/2012

## Principales indications

L'une des indications est l'exploration de la fertilité masculine, mais également :

Le diagnostic d'une infection génitale haute (orchépididymite, prostatite), en différenciant les germes pathogènes d'une éventuelle contamination par la flore commensale du gland ou du tiers distal de la muqueuse uréthrale. Le contrôle de la qualité du sperme dans le cadre de la fécondation in vitro et du don de sperme en vue d'insémination artificielle.

## Préconisations de prélèvement:

**Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de 3 à 4 jours. Ne pas utiliser de préservatif.**

- Miction urinaire.
- Lavage soigneux des mains au savon.
- Lavage du gland avec la lingette désinfectante remise par le laboratoire.
- Recueillir la totalité de l'éjaculât dans le flacon stérile mis à disposition par le laboratoire (Ne rien perdre du prélèvement ou le mentionner lors de l'enregistrement du dossier).
- Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil

## Transport au laboratoire

Si les flacons doivent être acheminés au laboratoire, ils doivent être maintenus à **37°C** pendant le trajet et apportés dans un délai **inférieur à 30 minutes**